Imprimir

Neguvon Polvo

Reg. No.: CICOPLAFEST RACO-INAC-168-17-0615-031

« Anterior | Siguiente »

Producto No.: 62290



Parasiticida contra parásitos internos y externos. (Polvo soluble.)

Descripción del Producto

Neguvon polvo es un organofosforado que mata los insectos y parásitos tanto por ingestión como por contacto al penetrar a través de la cutícula de los mismos.

Neguvon polvo, administrado a los animales por vía oral, pasa rápidamente a la sangre, donde permanece el tiempo necesario para aniquilar los parásitos más variados y comunes que se alimentan de humores corporales (sangre, linfa, suero, exudados, etc.) o que tengan contacto con ellos (por ejemplo larvas de las gusaneras, gusanos de la nariz en los borregos, lombrices en los intestinos, etc.).

En aplicación externa, **Neguvon polvo** atraviesa la piel y penetra los humores corporales, ejerciendo simultáneamente una acción sobre los ectoparásitos por fuera (por contacto) y desde dentro por medio de la sangre, linfa, etc. (por ingestión).

La concentración máxima de **Neguvon polvo** en la sangre, piel y resto del cuerpo se produce a las dos o tres horas después de la aplicación, con la que se aniquila a los parásitos.

Veinticuatro horas después del tratamiento, ya sólo persiste una mínima parte del producto activo en el cuerpo, que desaparece dentro de las horas siguientes.

Para uso exclusivo del Médico Veterinario Zootecnista.

Fórmula

Triclorfón al 90%.

Presentación

Sobre de 15 g.

Vía de Administración

USO EXTERNO
Aplicación/administración y dosificaciones

Ectoparásitos	Modo de aplicación y dosificación	Concentración
Melófagos Piojos ácaros (sarna) Moscas	Por lavado o aspersión de todo el animal. Repetición 5 días después. Contra las moscas, asperjar también el establo (piso, paredes, ventanas, pesebres, etc. frecuentados por las moscas)	Solución al 0.15%en agua = 15 g en 10 lt. 150 g en 100 lt. 1 kg en 660 lt.
Miasis (Gusanera bichera, larvas de moscas en heridas)	Tratar las heridas afectadas	Solución al 1% en agua = 15 g en 1.5 lts 150 g en 15 lts 1 kg en 100 lts
Hypoderma (Tábano) *Dermatobia* (Tórsalo) (Véase también Uso Interno)	Lavado de dorso usando una esponja, cepillo, o aspersión con 1 ó 2 lt. con intervalos de 4 semanas, según necesidad	Solución al 2% en agua = 60 g en 3 lt. 150 g en 7.5 lt. 1 kg en 50 lt.
Estefanofilaria (Véase también Uso Interno)	Repetidos toques de las partes afectadas, acompañando de un tratamiento interno	Solución al 10 % en agua =15 g en 150 ml 150 g en 1.5 lt.
Herpes (jiote)	Tras suavizar y desprender las costras, aplicar en toques varios días seguidos	

USO INTERNO

Indicaciónes, aplicación/administración y dosificaciones

Endo/Ectoparásitos	Modo de aplicación y dosificación	Concentración
Lombrices gastrointestinales:	En los alimentos:	**Neguvon (polvo)**
(Haemonchus,Oesophagostomum, Neoascaris vitulorum, Bunostomum,Cooperia, Ostertagia, Trichostrongylus)	5 g por cada 100 kg de peso corporal 2.5 g por cada 50 kg adicionales	Solución al 10% en agua Ejemplo: 15 g en 150 ml 150 g en 1.5 lt. 1 kg en 10 lt.
	Con botella o pistola dosificadora, por vía oral: Peso corporal (kg) — Dosis en ml 100 — 50 150 — 75	

Larvas de moscas: *Hypoderma, Dermatobia* (Tórsalo, tábano) Estefanofiliaria	200	100	7 ml
	250	125	
	300	150	
	400	200	
	500	250	
	Por cada 10 kg		

Sugerencia especial:

El tratamiento preventivo de los becerros mediante la «Pequeña Dosis Múltiple» de **Neguvon polvo** es altamente benéfico, ya que por medio de esta técnica, se crían becerros protegidos contra el ataque perjudicial de las lombrices, conservándose el mecanismo de crear la resistencia natural del organismo contra éstas.

Modo de empleo y dosis:
Adminístrense por vía oral, empezando a la edad de 6 a 8 semanas, cada 15 días la dosis de 2.5 g de **Neguvon polvo** en el alimento.

La dosis de 2.5 g de **Neguvon polvo** no varía hasta terminar este tratamiento a la edad de 5 a 6 meses. Los becerros así criados ostentarán un desarrollo y peso mucho mayor que los no tratados.

Ovinos y caprinos
Uso externo.

Técnicas de administración:
Bien mezclado con el alimento. La mezcla homogénea es esencial; después de un ayuno durante la noche anterior, todos los animales deben tener acceso simultáneo a los comederos.

Dosis

Proporcionar 5 g de **Neguvon Polvo** por cada 100 kg de peso corporal del conjunto de los animales de corral. Disuelto en la cantidad total equivalente al de un día de agua de bebida.

Se calculan las necesidades con 8 lt. de agua para cada 100 kg de peso corporal, dejando a los animales sin agua durante la noche anterior.

Suministrar 8 g de **Neguvon Polvo** por cada 10 lt. de agua de bebida, perfectamente bien disuelto.

Información Complementaria

En el caso del tratamiento del gusano de la nariz de los borregos se recomienda el uso de **Baymec Prolong** aplicándolo en zonas donde hay poca lana, por ejemplo, en el brazo, atrás del codo: 0.5 ml/25 kg

Características	Beneficios
Antiparasitario interno y externo	Permite el control de parásitos que tengan contacto con los humores corporales como sangre, linfa, suero, exudados. De hecho es el primer endectocida conocido
Alta biodisponibilidad	Después de la administración del producto, alcanza rápidamente concentraciones

	adecuadas para combatir parásitos externos e internos
Amplio espectro	Endoparásitos: *Oesophagostomun, Haemonchus, Bunostomum, Cooperia, Ostertagia, Trichostrongylus, Oestrus ovis o* gusano de la nariz. Ectoparásitos: Larvas de moscas como *Dermatobia e Hypoderma*, piojos, sarna
Bajo costo por tratamiento	Le permitirá ahorrar dinero en el combate de los parásitos, ya que es efectivo contra los principales problemas parasitarios de los animales
Versatilidad	Formulación en polvo para uso externo.

Enviar este artículo a un amigo